

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP09-11-92056460



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N°15
du 29 Octobre 1992

BULLETIN - I.N.R.A. - S.R.P.V.

AGRUMES

Les captures de mouche des fruits "Ceratitis Capitata" demeurent rares dans l'ensemble des vergers. On a noté cependant une présence sur les clémentines précoces souvent limitrophes des vergers de kakis dans les zones de Castellare, Casamozza, et Ghisonaccia.

Dans ce cas, on peut intervenir uniquement en périphérie du verger en vérifiant la présence journalière de mouches dans les gôbes mouches, quoiqu'il en soit les risques d'attaques vont diminuer dès l'apparition des premières nuits froides de novembre..

Cicadelles vertes

Elles ont été contrariées par les orages, inutile de traiter pour l'instant. En cas d'infestations contrôlées, intervenir en bordure des parcelles et uniquement sur les brises vent du type "cyprés".

Acarie

Inutile d'intervenir dans la majeure partie des vergers, la récolte étant proche pour les Corsica 1 et 2 et communes..

Toutefois dans les situations très particulières que l'on désire rétablir coûte que coûte, préférer les huiles.

Dans tous les cas, proscrire les acaricides longue durée type Appolo César.

Imprimerie de la Station de Casamozza
Directeur-Gérant : G.FELICI

Abonnement Annuel :
Régisseur de Recettes

Publication Périodique
CPPAP N° 1769 - AD

I S S N
0739-9633

S.R.P.V.

TRAITEMENT D'AUTOMNE DES ARBRES A NOYAU

Pêchers, Amandiers, Pruniers, Abricotiers, Cerisiers, Noisetiers

Les dernières périodes très ventées ont accéléré la chute des feuilles.

Profiter d'une acalmie pour réaliser le premier traitement sachant qu'une bonne protection s'obtient en trois applications de cuivre à la dose de 250 g de cuivre métal/hl .Avant, pendant, et après la chute des feuilles.

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bouillie bordelaise | (R.S.R.) |
| - Hydroxide | (Kocide) |
| - Oxychlorure | (Cupravit, Sandoz cuivre
Quinolate 400) |

Le Fusicocum :

Atteint souvent les pêchers et les amandiers.

Intervenir avec :

- | | |
|-------------|----------------------|
| - BENLATE | (Benomyl) |
| - PELT | (Methyl Thiophanate) |
| - BAVISTINE | (Carbendazime) |

Chancres

C'est la meilleure époque pour les traiter.
Le pinceau ou le pulvérisateur , buse à jet plat.
Badigeonner le mélange suivant :

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| - Bouillie Bordelaise. | = | 300 g |
| - Peinture vinylique | = | 1 kg |
| - Eau | = | 2 à 3 litres |

CULTURES MARAICHERES

Laitues, Scaroles

Les derniers orages vont contribuer à développer les attaques de BACTERIOSES.

Ces maladies se caractérisent par les symptômes suivants:

- 1) Taches huileuses et noires situées sur les feuilles.
- 2) Pourriture humide et noire des côtes des feuilles gagnant le coeur.

Les traitements préventifs permettent de contenir la maladie.
Traiter à 25 g de cuivre métal pour 100 m².

(C) - S.R.P.V. - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.